

ungsstelle, Herrn H. Lambert, Ffm.-Fechenheim, Schlichternerstraße 6 einzu-  
senden sind. Erinnern möchte ich ferner daran, daß auf die Beringung von  
Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Goldammer und Grünfink  
nur dann Wert gelegt wird, wenn der Beringer eine schriftliche Auswertung  
der erzielten Ergebnisse vornimmt. Auch von der Beringung der sogenann-  
ten „Stadtmäusen“ wolle man absehen und dafür in vermehrtem Um-  
fange „Waldmäusen“ beringen.

Ich möchte den X. Jahres-Bericht nicht schließen, ohne auch unseren  
ehrenamtlichen Mitarbeitern meinen Dank auszusprechen für ihre gewiss nicht  
leichte, und Opfer fordernde Mitarbeit. Möge das neue Vereinsjahr jedem  
Einzelnen recht schöne Erfolge, neue Erkenntnisse und vor allem viel Freude  
beim Umgang mit „Mutter Grün“ und ihren Lebewesen bringen.

Seb. Pfeifer.

## Wissenschaftlicher Teil.

### VII. Beringungsbericht

der Zweigberingungsstelle „Unterrhein“ der Staatlichen  
Vogelwarte Helgoland, Frankfurt (Main)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Nachtigall — <i>Luscinia m. megarrhynchos</i> (Brehm) . . . . .	8
Rotkehlchen — <i>Erithacus r. rubecula</i> (L.) . . . . .	186
Weißsterniges Blaukelchen — <i>Luscinia svecica svecica</i> (Wolf) . . . . .	5
Rotsterniges Blaukelchen — <i>Luscinia s. svecica</i> (L.) . . . . .	2
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.) . . . . .	327
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.) . . . . .	49
Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.) . . . . .	50
Mönchgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.) . . . . .	91
Dorngrasmücke — <i>Sylvia c. communis</i> (Lath.) . . . . .	58
Zaungrasmücke — <i>Sylvia c. curruca</i> (L.) . . . . .	35
Geispötter — <i>Hippodais icterina</i> (Vieill.) . . . . .	1
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> (Bechst.) . . . . .	100
Fitislaubsänger — <i>Phylloscopus tr. trochilus</i> (L.) . . . . .	27
Weidenlaubsänger — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.) . . . . .	46
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.) . . . . .	17
Zaunkönig — <i>Troglodytes tr. troglodytes</i> (L.) . . . . .	53
Großer Rohrsänger — <i>Acrocephalus a. arundinaceus</i> (L.) . . . . .	4
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus st. strepera</i> (Vieill.) . . . . .	51
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.) . . . . .	5
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.) . . . . .	7
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.) . . . . .	11
Braunkelchen — <i>Pratincola r. rubetra</i> (L.) . . . . .	11
Grauer Steinschmätzer — <i>Saxicola oenanthe</i> (L.) . . . . .	5

Singdrossel — <i>Turdus ph. philomelos</i> (Brehm.) . . . . .	212
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> (L.) . . . . .	2
Amsel — <i>Turdus m. merula</i> (Linn.) . . . . .	318
Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> (L.) . . . . .	415
Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> (L.) . . . . .	8
Haubenmeise — <i>Parus cristatus mitratus</i> (Brehm) . . . . .	22
Sumpfmeise — <i>Parus palustris communis</i> (Baldest.) . . . . .	64
Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> (L.) . . . . .	289
Schwanzmeise — <i>Parus caudatus europaeus</i> (Herm.) . . . . .	35
Kleiber — <i>Sitta europaea caesia</i> (Wolf) . . . . .	45
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris macrodactyla</i> (Brehm) . . . . .	5
Grauer Fliegenschnäpper — <i>Muscicapa str. striata</i> (Pall.) . . . . .	25
Trauerfliegenschnäpper — <i>Muscicapa atr. atricapilla</i> (L.) . . . . .	355
Weißbachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> (L.) . . . . .	45
Gebirgsbachstelze — <i>Motacilla b. boadula</i> (L.) . . . . .	7
Schafstelze — <i>Motacilla fl. flava</i> (L.) . . . . .	25
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i> (L.) . . . . .	2
Baumpieper — <i>Anthus tr. trivialis</i> (L.) . . . . .	16
Feldlerche — <i>Alauda ar. arvensis</i> (L.) . . . . .	5
Haubenlerche — <i>Galerida cri. cristata</i> (L.) . . . . .	8
Graumammer — <i>Emberiza ca. calandra</i> (L.) . . . . .	1
Goldammer — <i>Emberiza ci. citrinella</i> (L.) . . . . .	70
Rohrammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.) . . . . .	12
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.) . . . . .	200
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> (L.) . . . . .	9
Hausspaz — <i>Passer d. domestica</i> (L.) . . . . .	90
Feldspaz — <i>Passer m. montana</i> (L.) . . . . .	262
Bluthänfling — <i>Acanthis ca. cannabina</i> (L.) . . . . .	95
Girliß — <i>Serinus candria serinus</i> (L.) . . . . .	107
Erlenzeisig — <i>Acanthis spinus</i> (L.) . . . . .	109
Distelfink — <i>Acanthis ca. carduelis</i> . . . . .	18
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i> (Vieill.) . . . . .	7
Grünling — <i>Chloris chl. chloris</i> (L.) . . . . .	462
Kirschkerbeißer — <i>Coccothraustes co. coccothraustes</i> (L.) . . . . .	50
Wasserstar — <i>Cinclus ci. aquaticus</i> (Bechst.) . . . . .	4
Star — <i>Sturnus vu. vulgaris</i> (L.) . . . . .	1088
Raubwürger — <i>Lanius ex. excubitor</i> (L.) . . . . .	5
Rotrück-Würger — <i>Lanius collurio</i> (L.) . . . . .	215
Rotkopfwürger — <i>Lanius s. senator</i> (L.) . . . . .	19
Rauchschwalbe — <i>Hirundo r. rustica</i> (L.) . . . . .	511
Mehlschwalbe — <i>Chelidon u. urbica</i> (L.) . . . . .	14
Uferschwalbe — <i>Riparia r. riparia</i> (L.) . . . . .	2
Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.) . . . . .	34
Eisvogel — <i>Alcedo i. ispida</i> (L.) . . . . .	7
Grünspecht — <i>Picus viridis pinetorum</i> (Brehm) . . . . .	2
Grünspecht — <i>Picus c. canus</i> (Gm.) . . . . .	1
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Brehm) . . . . .	20

Wendehals — <i>Jynx t. torquilla</i> (L.) . . . . .	56
Kuckuck — <i>Cuculus c. canorus</i> (L.) . . . . .	1
Rabenkrähe — <i>Corvus c. corone</i> (L.) . . . . .	4
Eichelhäher — <i>Garrulus gl. glandarius</i> (L.) . . . . .	31
Steinkauz — <i>Athene n. noctua</i> (Scop.) . . . . .	20
Waldkauz — <i>Strix a. aluco</i> (L.) . . . . .	4
Schleiereule — <i>Tyto alba guttata</i> (Brehm) . . . . .	4
Turmfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> (L.) . . . . .	12
Mäusebussard — <i>Buteo b. buteo</i> (L.) . . . . .	2
Hühnerhabicht — <i>Accipiter g. gentilis</i> (L.) . . . . .	3
Roter Milan — <i>Milvus m. milvus</i> (L.) . . . . .	7
Hohltaube — <i>Columba o. oenas</i> (L.) . . . . .	1
Turdeltaube — <i>Streptopelia t. turtur</i> (L.) . . . . .	6
Rebhuhn — <i>Perdix p. perdix</i> (L.) . . . . .	1
Jagd-Fasan — <i>Phasianus c. colchicus</i> (L.) . . . . .	5
Weißer Storch — <i>Ciconia c. ciconia</i> (L.) . . . . .	16
Alpenstrandläufer — <i>Calidris a. alpina</i> (L.) . . . . .	7
Zwergstrandläufer — <i>Calidris minuta</i> (Leisl.) . . . . .	2
Gemeine Bekassine — <i>Gallinago g. gallinago</i> (L.) . . . . .	4
Austernfischer — <i>Haematopus o. ostralegus</i> (L.) . . . . .	2
Fluß-Seeschwalbe — <i>Sterna h. hirundo</i> (L.) . . . . .	9
Lachmöve — <i>Larus r. ridibundus</i> (L.) . . . . .	10

Zusammen 7057 Vögel in 92 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert „Die Vögel der palaearktischen Fauna“ vorgenommen.)

## Rückmeldungen.

### *Erithacus r. rubecula* (L.) — Rotkehlchen

1. H8156515, ad.: 16. 11. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 7. 12. 35 u. 5. 4. 36 u. 2. 7. 36 Ffm.-Fechenheim.
2. H8152194, ad.: 18. 10. 35 Bergen; tot gef. 12. 5. 36 Frankfurt a. M. 4 km W.
3. H8081301, juv.: 8. 7. 34 Enkheim; gef. u. freigel. 29. 3. 36 Enkheim.

### *Phoenicurus ph. phoenicurus* (L.) — Gartenrotschwanz.

4. H857677 A, ad.: ♂: 19. 4. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 8. 4. 36 Ffm.-Fechenheim.
5. H9054829, ad.: ♀: 22. 8. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 16. 6. 36 Ffm.-Fechenheim.
6. H964809, ad.: ♂: 20. 6. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 5. 34 und 23. 6. 35 und 22. 4. 36 Ffm.-Fechenheim.
7. H8151992, juv. 7. 7. 35 Ffm.-Süd; tot gef. 10. 5. 36 Ffm.-Süd.
8. H8151594, ad.: ♂. 5. 36 Enkheim; gef. u. freigel. 2. 7. 36 Enkheim.

9. H865177 A, juv.: 6. 7. 34 Ffm.-Süd; tot gef. Ende Mai 1936 Mannheim 85 km S.
10. H8082418, juv.: 20. 5. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. 13. 6. 36 Hérégian, Prov. Hérault Frankreich 850 km SW.

### *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Gm.) — Hausrotschwanz.

11. Siehe Wiederfunde in der Arbeit „Wiederfunde im Untermaintal beringter Hausrotschwänze“.

### *Sylvia a. atricapilla* (L.) — Mönchgrasmücke.

12. H8157705, pull.: 14. 6. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 11. 9. 36 Ffm.-Fechenheim.
13. H8155486, juv.: 23. 8. 35 Buchhof, Mainharter Wald, Württemberg; tot gef. 14. 1. 37 Guelma Algerien 1500 km SSW.

### *Troglodytes tr. tr.* (L.) — Zaunkönig.

14. H8156504, ad. ♂ 29. 11. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 20. 1. 36 u. 21. 2. 36 Ffm.-Fechenheim.

### *Turdus ph. philomelos* (Brehm) — Singdrossel.

15. H6055654, pull.: 2. 6. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 3. 7. 36 Ffm.-Fechenheim.
16. H6000995, pull.: 18. 5. 35 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 22. 6. 36 Gr. Auheim b. Hanau 15 km O.
17. H6000772, pull.: 2. 6. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 14. 4. 36 Ffm.-Fechenheim.
18. H6000760, pull.: 25. 4. 35 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 26. 5. 36 Ffm.-Fechenheim.
19. H672083 A, pull.: 27. 6. 35 Hohemark (Taunus); tot gef. 18. 9. 36 Mainz 35 km SW.
20. H6053278, pull.: 12. 5. 36 Ffm.-Fechenheim; gesch. 11. 10. 36 Livinhac le Haut (Aveyron Frankreich) 700 km SW.

### *Turdus m. merula* (Linn.) — Amsel.

21. H641251, pull.: 28. 6. 28 Bischofsheim; v. Käse gef. 6. 3. 36 Fichtengrund Kr. Niederbarnim 450 km NO.

### *Parus m. major* (L.) — Kohlmeise.

22. H8079728, ad.: 8. 2. 36 Naurod i. Th.; tot gef. 29. 4. 36 Ober-Roßbach (Oberhessen) 40 km NO.

### *Muscicapa str. striata* (Pall.) — Grauer Fliegenschnepper.

23. H9009552, pull.: 20. 4. 35 Bischofsheim; gef. u. freigel. 1. 6. 36 Bergen 3 km NW.

*Muscicapa atr. atricapilla* (L.) — Trauerfliegenschnepper.

24. H8082469, pull.: 12. 6. 55 Ffm.-Fechenheim; tot gef. September 1955 Saint-Beauzély (Frankreich) 900 km SW.

*Fringilla c. coeleps* (L.) — Buchfink.

25. H800100, ad. ♂: 20. 2. 54 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 10. 4. 56 Ffm.-Fechenheim.  
26. H800099, ad. ♂: 19. 5. 54 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 19. 5. 56 Ffm.-Fechenheim.  
27. H8156559, ad. ♀: 22. 12. 55 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 11. 4. 56 Ffm.-Fechenheim.  
28. H8009585, pull.: 10. 5. 55 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 1. 6. 56 Frankfurt a. M. 5 km W.

*Passer m. montana* (L.) — Feldspatz.

29. H8157878, juv.: 19. 8. 56 Dörnigheim; gesch. 19. 9. 56 Gemmingen (Baden) 140 km SO.  
30. H8157884, juv.: 19. 8. 56 Dörnigheim; gesch. 29. 1. 57 Großweilzheim 40 km SO.

*Acánthis ca. cannabina* (L.) — Bluthänfling.

31. H8009776, pull.: 29. 5. 54 Ffm.-Höchst; gef. 20. 11. 55 Fajae en Val (Carcassonne Frankreich) 950 km SW.

*Serinus canaria serinus* (L.) — Girlitz.

32. H9003925, ad.: 15. 5. 55 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 22. 5. 56 Ffm.-Süd.  
33. H9003922, ad.: 1. 5. 55 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 7. 5. 56 Ffm.-Süd.  
34. H9055008, ad.: 12. 7. 55 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 7. 5. 56 Ffm.-Süd.  
35. H9055002, ad.: 27. 6. 55 Ffm.-Süd; gef. u. freigel. 7. 5. 56 Ffm.-Süd.  
36. H9090645, juv.: 1. 6. 56 Fulda; gef. 11. 11. 56 Bollene Dep. Vauclose (Frankreich) 700 km SSW.

*Acánthis spinus* (L.) — Erlenzeisig.

37. H8080788, ad. ♀: 5. 4. 55 Ffm.-Ost; gef. 17. 1. 56 Orp le grand (Belgien) 300 km NW.  
38. H8156689, ad. ♀: 10. 11. 56 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 12. 12. 56 Prinzenhage (Südholland) 350 km NW.

*Chlórís chl. chlórís* (L.) — Grünling.

39. H8155535, ad.: 10. 1. 56 Ffm.-Nord; krank gef. 15. 6. 56 Offenbach 8 km S.  
40. H8078789, ad.: 5. 2. 55 Ffm.-Ost; tot gef. 16. 6. 56 Oppau (Rheinpfalz) 80 km SSW.

*Coccothraústes co. coccothraústes* (L.) — Kirschkernebeißer.

41. H722853, ad.: 5. 6. 55 Ffm.-West; tot gef. 2. 8. 56 Fürstenberg (Weser) 185 km NNO.

42. H6001273, ad.: 4. 7. 55 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 5. 4. 56 Ffm.-Nord.  
43. H722844, ad.: 7. 4. 55 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 4. 4. 56 Ffm.-Nord.

*Cinclus ci. aquaticus* (Bechst.) — Wasserstar.

44. H672035 A, ad.: 1. 9. 55 Hohemark; gef. u. freigel. 6. 8. 56 Hohemark.

*Sturnus vu. vulgaris* (L.) — Star.

45. H799391, pull.: 4. 5. 26 Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 25. 1. 57 Ffm.-Nord.  
46. H641979, pull.: 15. 5. 55 Ffm.-Nord; tot gef. Januar 1956 Frankfurt a. M.  
47. H647169, pull.: 12. 5. 54 Ffm.-Süd; tot gef. 2. 1. 57 Frankfurt a. M.  
48. H6055469, pull.: 22. 6. Ffm.-Nord; gef. u. freigel. 29. 1. 17 Ffm.-Nord.  
49. 618084 A, pull.: 8. 5. 56 Naurot i. T.; gesch. 30. 10. 56 Laubenheim (Mainz) 20 km S.  
50. H672561 A, pull.: 10. 5. 55 Ffm.-Süd; tot gef. Juni 1956 Frankfurt a. M. 20 km W.  
51. H605997 A, pull.: 8. 5. 55 Bergen; gesch. 21. 10. 55 Saint Pons (Frankreich) 900 km SW.  
52. H618520 A, pull.: 27. 5. 52 Ffm.-Fechenheim; gesch. 5. 5. 56 Moulis Gironde (Frankreich) 900 km SW.  
53. H6017555, pull.: Ffm.-Fechenheim; tot gef. 2. 2. 57 Oberwiesen (Pfalz) 100 km SSW.

*Lanius collurio* (L.) — Rotr. Würger.

54. H799564, pull.: 6. 6. 56 Dörnigheim; gef. u. freigel. 28. 6. 56 Ffm.-Fechenheim 8 km W.

*Hirundo r. rustica* (L.) — Rauchschnalbe.

55. H8155745, ad.: 31. 8. 55 Dörnigheim; tot gef. 18. 5. 56 Kleinkarlbach (Rheinpfalz) 90 km SSW.  
56. H8155667, ad.: 24. 8. 55 Dörnigheim; gef. u. freigel. Mai 1956 Nieder-issigheim 20 km NO.  
57. H8155704, juv.: 24. 8. 55 Dörnigheim; gef. u. freigel. Juni 1956 Re- volzhausen 50 km NO.  
58. H855165 A, pull.: 2. 8. 55 Himmighofen; tot gef. Juni 1956 Marienfels (Kr. Goershausen) 40 km NW.  
59. H8080625, pull.: 17. 6. 54 Nieder-Dorfelden; als Skelett gef. 27. 12. 56 St. Martin de Grau (Dep. Bouche du Rhône Frankreich) 800 km SSW.

*Alcedo i. ispida* (L.) — Eisvogel.

60. H8157815, juv.: 25. 7. 56 Dörnigheim; tot gef. Anf. August 1956 Seligenstadt (Hessen) 20 km SO.

*Garrulus gl. glandarius* (L.) — Eichelhäher.

61. H6000578, pull.: 5. 6. 56 Enkheim; gesch. 24. 8. 56 Bergen 5 km N.  
62. H630755 A, juv.: 24. 5. 56 Oberursel; gesch. 6. 7. 56 Kronberg 6 km SW.

63. H 606056 A, ad.: 10. 12. 32 Ffm.-Sandhof; v. Käse gef. Juni 1936 Frankfurt a. M. 5 km S.  
 64. H. 544547, juv.: 24. 7. 35 Ffm.-Stüd; gef. 24. 9. 35 St. Victor de Cessieu (Isère Frankreich) 500 km SW.

**Athene n. noctua (Scop.) — Steinkauz.**

65. H 45404, pull.: 30. 4. 34 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 10. 11. 36 Enkheim 5 km N.  
 66. H 410361, pull.: 8. 6. 36 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 10. 8. 36 Ffm.-Fechenheim.  
 67. H 410083, pull.: 13. 6. 36 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 9. 10. 36 Mühlheim a. M. 5 km O.

**Falco t. tinnunculus (L.) — Turmfalke.**

68. H 501196, pull.: 7. 6. 28 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 29. 5. 36 Flörsheim 25 km SW.  
 69. H 511821, pull.: 25. 6. 35 Bergen; gesch. 20. 1. 36 Klatovy, Böhmerwald (Klatfau) 350 km OSO.

**Accipiter n. nisus (L.) — Sperber.**

70. H 557698, pull.: 15. 6. 34 Dietesheim (Wald); gesch. 4. 1. 36 St. Martin d. Ary (Montguyon Frankreich) 900 km SW.

**Accipiter g. gentilis (L.) — Hühnerhabicht**

71. H 502020, pull.: 5. 6. 32 Neu-Isenburg; tot gef. Ende Mai 1936 Ober-Klein-Gumpen (Odenwald) 35 km S.

**Ciconia c. ciconia (L.) W. Storch.**

72. H 205256, pull.: 25. 6. 33 Rothenbergen; tot gef. Juni 1936 Glauburg bei Büdingen 20 km N.

Neben den hier aufgeführten Wiederfunden liegen noch 306 örtliche Wiederfunde von Kohl-, Blau-, Sumpfschneisen und Grünfinken vor.

**Anmerkung:** Die 5- oder 6- und 7 stellige Zahl ist die Ringnummer, gef.- gefangen, tot gef.- tot gefunden, Ffm.- Frankfurt am Main.

H. Lambert.

**Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1936/37.**

Herr Appenroth . . . . .	220	Herr L. Henkel . . . . .	75
„ Auth . . . . .	85	„ W. Henkel . . . . .	922
„ Berk . . . . .	70	„ Dr. Hohorst . . . . .	51
„ Dr. Brunner . . . . .	18	„ Heuser . . . . .	54
„ Effery . . . . .	655	„ Hoehl . . . . .	577
„ Giebel . . . . .	50	„ Klaas . . . . .	505
„ Garnier . . . . .	71	„ Kopecki . . . . .	61

Herr Knopp . . . . .	158	Herr Ohlis . . . . .	291
„ Koller . . . . .	12	„ Pfeifer . . . . .	267
„ Klauer . . . . .	30	„ Rotter . . . . .	170
„ Lambert . . . . .	1114	„ Wilhelm . . . . .	120
„ Löchner . . . . .	152	„ Suckfüll . . . . .	12
„ Loos . . . . .	65	„ Saleck . . . . .	69
„ Müller-Schnee . . . . .	246	„ Schmutzler . . . . .	514
„ Maurer I. . . . .	34	„ Schomberg . . . . .	51
„ Maurer II. . . . .	152	„ Steyer . . . . .	144
„ Mack . . . . .	147	„ Weipel . . . . .	158
„ Möltgen . . . . .	129	„ Weil . . . . .	52

**Wiederfänge, die im Jahre 1936/37 von den einzelnen Mitarbeitern getätigt und gemeldet wurden.**

Herr Appenroth . . . . .	10	Herr W. Henkel . . . . .	12	Herr Lambert . . . . .	74
„ Auth . . . . .	2	„ Klaas . . . . .	8	„ Pfeifer . . . . .	17
„ Effery . . . . .	9	„ Knopp . . . . .	3	„ Rotter . . . . .	4
„ L. Henkel . . . . .	17	„ Müller-Schnee . . . . .	142	„ Wilhelm . . . . .	9
„ Heuser . . . . .	3	„ Schmutzler . . . . .	6	„ Saleck . . . . .	2

**Wiederfunde im Untermaintal bringter Hausrotschwänze.  
(Ph. ochrúros gibraltariensis Gm.)**

Wenn die Wanderwege der deutschen Hausrotschwänze auch schon weitgehend durch die Arbeit im „Vogelzug“ Jahrg. 3 S. 105-115 1932 „Vom Zug des Gartenrotschwanzes und des Hausrotschwanzes“ (53. Ringfund-Mitteilung Helgoland, 57. Ringfund-Mitteilung Rositten) von R. Drost und H. Desselberger bekannt sind, so sind doch die Nah- oder Heimatfunde, die uns Aufschluß über den zeitlichen Ablauf des Zuges der Hausrotschwänze geben, aus Raumangel nur Zusammenfassend behandelt worden. Dies soll in der vorliegenden Arbeit für die Population im Untermaintal, die sich auf die Ergebnisse einer planmäßigen Beobachtung und Beringung von einigen Mitarbeitern der Zweigberingungsstelle „Untermaintal“ der staatl. Vogelwarte Helgoland, der letzten fünf Jahre stützen, nachgeholt werden.

**Ankunft:** Anfang März bis Mitte April, so am 15. 3. 31, 13. 3. 32, 17. 3. 33, 11. 3. 34, 15. 3. 35, 16. 3. 36. Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Erstbeobachtungen eines jeden Jahres, wobei doch noch die Möglichkeit besteht, daß einige Vögel schon etwas früher angekommen sein können. Zunächst handelt es sich meist um Durchzügler, bei denen das männliche Geschlecht sehr stark überwiegt. Folgende Wiederfunde zeigen, daß mit den ersten Durchzüglern auch schon die im Untermaintal beheimateten Hausrotschwänze in ihr Brutgebiet zurückkehren.

1. H 822488 ad. ♂ 8. 3. 30 Ffm.-Fechenheim, gef. u. freigel. 16. 3. 31 und tot gef. 8. 4. 34 Ffm.-Fechenheim.