

wirtschaft einzusetzen, sowie die von einigen Vogelarten angerichteten Schäden mit Hilfe moderner Technik abzuwehren. Hat es sich doch gezeigt, daß menschliche Eingriffe in das Gleichgewicht der Natur letztlich immer zum Schaden des Menschen ausgegangen sind, wie zahllose Beispiele im Laufe der Geschichte gezeigt haben. Darum müssen die Erkenntnisse der modernen Forschung so eingesetzt werden, daß unser Dasein auf der Erde nicht gefährdet und die mit uns lebende Tier- und Pflanzenwelt in ihrem Bestande und gegenseitigen harmonischen Zusammenspiel nicht allzusehr gestört wird, damit Katastrophen vermieden werden können.

Anschrift des Verfassers: Dr. WERNER KEIL, 6 Frankfurt M.-Fechenheim, Steinauer Str. 44

Beringungsbericht 1965

zusammengestellt von GERHARD LAMBERT¹⁾

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Fischreiher — <i>Ardea cinerea</i>		1	1
Weißstorch — <i>Ciconia ciconia</i>	29		29
Stockente — <i>Anas platyrhynchos</i>	1	4	5
Mäusebussard — <i>Buteo buteo</i>		4	4
Sperber — <i>Accipiter nisus</i>		1	1
Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>		21	21
Roter Milan — <i>Milvus milvus</i>	18	4	22
Schwarzer Milan — <i>Milvus migrans</i>	24		24
Rebhuhn — <i>Perdix perdix</i>	3	2	5
Wasserralle — <i>Rallus aquaticus</i>		1	1
Tüpfelsumpfhuhn — <i>Porzana porzana</i>		2	2
Teichhuhn — <i>Gallinula chloropus</i>		12	12
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>	84	67	151
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius</i>	4	5	9
Bekassine — <i>Capella gallinago</i>	3	62	65
Zwergschnepfe — <i>Limnodytes minimus</i>		17	17
Großer Brachvogel — <i>Numenius arquata</i>	4		4
Uferschnepfe — <i>Limosa limosa</i>		1	1
Bruchwasserläufer — <i>Tringa glareola</i>		16	16
Rotschenkel — <i>Tringa totanus</i>		1	1
Dunkler Wasserläufer — <i>Tringa erythropus</i>		2	2
Grünschenkel — <i>Tringa nebularia</i>		1	1
Flußuferläufer — <i>Actitis hypoleucos</i>		23	23
Zwergstrandläufer — <i>Calidris minuta</i>		2	2
Kampfläufer — <i>Philomachus pugnax</i>		9	9
Hohltaube — <i>Columba oenas</i>	5		5
Ringeltaube — <i>Columba palumbus</i>		9	9
Turteltaube — <i>Streptopelia turtur</i>		2	2
Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i>	4	14	18
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i>		1	1
Schleiereule — <i>Tyto alba</i>	2	1	3
Waldkauz — <i>Strix aluco</i>	12	63	75
Waldohreule — <i>Asio otus</i>		1	1
Mauersegler — <i>Apus apus</i>	11	15	26

¹⁾ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß dieser Beringungsbericht keine Wiederfundmeldung der Vogelwarte Helgoland ist.
Die Schriftleitung

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Eisvogel — <i>Alcedo atthis</i>		9	9
Wiedehopf — <i>Upupa epops</i>		1	1
Grünspecht — <i>Picus viridis</i>	9		9
Grauspecht — <i>Picus canus</i>	9	6	15
Buntspecht — <i>Dendrocopos major</i>	15	59	74
Kleinspecht — <i>Dendrocopos minor</i>		2	2
Mittelspecht — <i>Dendrocopos medius</i>	3	5	8
Schwarzspecht — <i>Dryocopus martius</i>	11	2	13
Wendehals — <i>Jynx torquilla</i>	17	12	29
Heidelerche — <i>Lullula arborea</i>	7		7
Feldlerche — <i>Alauda arvensis</i>	15	13	28
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica</i>	58	564	622
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica</i>	129	198	327
Uferschwalbe — <i>Riparia riparia</i>		230	230
Pirol — <i>Oriolus oriolus</i>	9		9
Dohle — <i>Coloeus monedula</i>	64	1	65
Elster — <i>Pica pica</i>	4	4	8
Eichelhäher — <i>Garrulus glandarius</i>		20	20
Kohlmeise — <i>Parus major</i>	146	113	259
Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i>	1327	133	1460
Tannenmeise — <i>Parus ater</i>	132	23	155
Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i>	6	20	26
Sumpfmehse — <i>Parus palustris</i>	32	22	54
Weidenmeise — <i>Parus atricapillus</i>		8	8
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus</i>	20	24	44
Kleiber — <i>Sitta europaea</i>	424	133	557
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris</i>	4		4
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla</i>	82	33	115
Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i>	11	30	41
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus</i>	65	137	202
Misteldrossel — <i>Turdus viscivorus</i>	7		7
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i>	29	4	33
Singdrossel — <i>Turdus philomelos</i>	7	33	40
Rotdrossel — <i>Turdus iliacus</i>		28	28
Amsel — <i>Turdus merula</i>	61	5	66
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oenanthe</i>	4	3	7
Schwarzkehlchen — <i>Saxicola torquata</i>		5	5
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i>		14	14
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	190	104	294
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros</i>	99	58	157
Nachtigall — <i>Luscinia megarhynchos</i>	2	13	15
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica svecica</i>		3	3
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i>		25	25
Rotkehlchen — <i>Erithacus rubecula</i>	7	147	154
Feldschwirl — <i>Locustella naevia</i>	4		4
Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>		3	3
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	27	156	183
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i>	30	62	92
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		24	24
Gelbspötter — <i>Hippolais icterina</i>	10	3	13
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia atricapilla</i>	53	88	141
Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i>	21	50	71
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis</i>	27	38	65
Klappergrasmücke — <i>Sylvia curruca</i>	3	16	19
Zilpzalp — <i>Phylloscopus collybita</i>	55	84	139

	Nestl.	Fängl.	Ges.
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>		39	39
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	126	9	135
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus regulus</i>		9	9
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus ignicapillus</i>		1	1
Grauschnäpper — <i>Muscicapa striata</i>	18	7	25
Trauerschnäpper — <i>Ficedula hypoleuca</i>	1969	274	2243
Heckenbraunelle — <i>Prunella modularis</i>	4	107	111
Baumpieper — <i>Anthus trivialis</i>	15	39	54
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i>		13	13
Bachstelze — <i>Motacilla alba</i>	56	67	123
Gebirgsstelze — <i>Motacilla cinerea</i>	17	48	65
Schafstelze — <i>Motacilla flava</i>	5	1248	1253
Nordische Schafstelze — <i>Motacilla flava thunbergi</i>		1	1
Seidenschwanz — <i>Bombicilla garrulus</i>		2	2
Raubwürger — <i>Lanius excubitor</i>	4		4
Schwarzstirnwürger — <i>Lanius minor</i>		1	1
Rotkopfwürger — <i>Lanius senator</i>	4		4
Neuntöter — <i>Lanius collurio</i>	10	3	13
Star — <i>Sturnus vulgaris</i>	34	22	56
Kernbeißer — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	5	375	380
Grünling — <i>Carduelis chloris</i>		28	28
Stieglitz — <i>Carduelis carduelis</i>	8	344	352
Zeisig — <i>Carduelis spinus</i>		1055	1055
Hänfling — <i>Carduelis cannabina</i>		6	6
Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i>		82	82
Girlitz — <i>Serinus serinus</i>		75	75
Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	9	437	446
Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia curvirostra</i>		3	3
Buchfink — <i>Fringilla coelebs</i>	4	332	336
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i>		1510	1510
Goldammer — <i>Emberiza citrinella</i>	15	129	144
Grauammer — <i>Emberiza calandra</i>	4	74	78
Zaunammer — <i>Emberiza cirrus</i>	4		4
Zippammer — <i>Emberiza cia</i>	12	3	15
Rohrhammer — <i>Emberiza schoeniclus</i>	15	529	544
Haussperling — <i>Passer domesticus</i>		2	2

Nicht in Hessen beringte Arten:

Säbelschnäbler — <i>Recurvirostra avosetta</i>	2		2
Trauerseeschwalbe — <i>Chlidonias niger</i>		1	1

Zusammen 15 786 Stück in 127 Arten bzw. Rassen.

Berichtigung zum Beringungsbericht 1964 (*Luscinia* 38, S. 86–99, 1965):

streichen:	Nestl.	Fängl.	Ges.
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica svecica</i>		31	31
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i>		8	8
Kleines Sumpfhuhn — <i>Porzana parva</i>		6	6

aufnehmen:

Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica svecica</i>		5	5
Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i>		31	31

An den Beringungen sind die einzelnen Mitarbeiter wie folgt beteiligt:

	Nestl.	Fängl.	Gesamt
J. Althen	189	100	289
A. Armbrust	329	227	556
J. Bartholmes		366	366
J. Bracke	106	704	810
H. Döpfer	412	68	480
W. G. Eckert	10	26	36
H. Friedrichs	17	58	75
H. G. Fritzen	467	252	719
R. Gesell	15	89	104
E. Gerlach	64	17	81
J. Glanzner	16	82	98
G. Göhring		14	14
U. Heseler	19	30	49
A. Hesse		100	100
Ph. Heuser	5	68	73
O. Jost	61	169	230
R. Jäger	21	22	43
H. Kenneweg	365	1055	1420
C. Klaas		30	30
K. Kliebe		90	90
G. Lambert	519	289	808
B. Lokal	55	123	178
H. Ludwig	11	19	30
J. Meister	15	11	26
R. Mohr	764	1409	2173
W. Müller-Schnee		135	135
K. Raab	10	22	32
K. Rembser	98	149	247
K. Rothmann, K. Hillerich, H. Zettl, S. Schönmeyer	879	2175	3054
J. Schönberger	90	249	339
K. Schmidt		27	27
W. Schwab		355	355
E. Spamer	156	158	314
S. Stecher	134	68	202
B. Steyer	153	574	727
W. Stumpf		250	250
Vogelschutzwarte Frankfurt/Main	445	311	756
W. Vogt	62	24	86
O. R. Wilhelm	271	93	364

Wiederfunde die mehr als 10 km vom Beringungsort entfernt liegen

					Habicht — <i>Accipiter gentilis</i>
3.	3 022 028	*	2. 9. 1964	diesj. ♀	Griesheim b. Darmstadt (Rothmann)
				+	30. 10. 1964 (gesch.) Biebesheim/Groß-Gerau, ca. 11 km SW.
4.	395 073	*	28. 10. 1965	Fängl. ♂	Enkheim/Hanau (Vogelschutzwarte Frankfurt/M.)
				V	21. 2. 1966 (kontr.) Steinbach/Ts., ca. 15 km NWW.
5.	382 790	*	8. 5. 1962	ad Ffm.-Fechenheim	(Vogelschutzwarte Frankfurt/M.)
				×	20. 3. 1963 (tot gef.) Rodheim/Friedberg, ca. 16 km N.
6.	395 074	*	27. 10. 1965	ad ♂	Enkheim/Hanau (Vogelschutzwarte Frankfurt/M.)
				×	27. 2. 1966 (tot gef.) Dreieichenhain/Offenbach, ca. 17 km SSW.

¹⁾ bilden eine Beringungsgemeinschaft, bei Wiederfunden wird jeweils nur der erste Name erwähnt.

7. 395 045 * 4. 11. 1964 ad Ffm.-Fechenheim (Vogelschutzwarte Frankfurt/M.)
× 27. 3. 1966 (tot gef.) Darmstadt, ca. 30 km SSW.
8. 3 022 003 * 18. 9. 1964 Fängl. Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann)
(?) 15. 2. 1965 (gefangen) Gernsheim-Allmenfeld/Groß-Gerau, ca. 30 km SWW.
9. 3 022 073 * 19. 10. 1964 diesj. ♀ gefangen b. Darmstadt, freigel. Messel/Darmstadt (Fritzen)
+ 18. 3. 1965 (gesch.) Gondelsheim/Bruchsal, ca. 80 km S.
10. 3 021 986 * 25. 8. 1964 Fängl. Grube Messel b. Darmstadt (Stephan)
× 23. 10. 1965 (tot gef.) Mühlheim/Offenbach (Stahlberg), ca. 22 km NNE.

Fortsetzung von Band 37, S. 15, 1964

Schwarzer Milan — *Milvus migrans*

9. 3 017 744 ○ 23. 6. 1963 nestl. Trebur/Groß-Gerau (Rothmann)
V 26. 7. 1965 (kontr.) Frankfurt/Main-Flughafen, ca. 17 km NE.
10. 3 017 712 ○ 17. 6. 1963 nestl. Groß-Gerau (Rothmann)
+ 18. 9. 1965 (wahrscheinlich geschossen) b. Narbonne (43.11 N-3.00 E) Frankreich, ca. 850 km SW.
11. 3 017 131 ○ 26. 6. 1964 nestl. Groß-Gerau (Rothmann)
V 11. 5. 1965 („angekommen, gepflegt und freigelassen“) Elkelaa M'gouna (32.02 N-7.23 W) Marokko, ca. 2350 km SW.

Baumfalke — *Falco subbuteo*

1. 5 092 815 * 28. 8. 1964 ad Lengfeld/Dieburg (Rothmann)
+ 16. 10. 1965 (geschossen an einem dieser Tage) Rabat (35.53 N-14.25 E) Malta, ca. 1600 km SSE.

Fortsetzung von Band 38, S. 90, 1965

Kiebitz — *Vanellus vanellus*

7. 5 114 491 ○ 6. 5. 1964 nestl. Groß-Gerau (Rothmann)
+ 4. 3. 1965 (getötet) Agde (43.19 N-3.29 E) Hérault, Frankreich, ca. 800 km SW.
8. 5 097 180 ○ 27. 4. 1964 nestl. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
× 18. 3. 1965 (verwundet, gepflegt) Dieue sur Mense (49.03 N-5.25 E), Mense, Frankreich, ca. 265 km SWW.
9. 6 189 151 ○ 11. 5. 1965 nestl. Hergershausen/Dieburg (Rothmann)
V 16. 8. 1965 (kontr.) Schwerte/Ruhr, Nordrhein-Westfalen, ca. 200 km NW.

Fortsetzung von Band 36, S. 12, 1963

Bekassine — *Capella gallinago*

2. 7 367 433 * 1. 4. 1964 Fängl. Hergershausen/Dieburg (Rothmann)
+ 16. 11. 1964 (gesch.) Polder von Oss (51.46 N-5.31 E) N.-Brabant, Niederlande, ca. 320 km NW.
3. 7 262 552 * 23. 8. 1965 ad Trebur/Groß-Gerau (Rothmann)
+ 3. 10. 1965 (gesch.) in den Sümpfen bei Rochefort (45.57 N-O. 58 W), Char. Maritime (Frankreich), ca. 825 km SWW.

4. 7 419 051 * 10. 8. 1964 diesj. b. Schweinsberg/Marburg (Kliebe)
+ 6. 12. 1964 (getötet) b. Tarascon (43.48 N-4.39 E) Bouches-du-Rhône, Frankreich, ca. 820 km SW.
5. 7 419 016 * 3. 4. 1964 Fängl. b. Moischt/Marburg (Kliebe)
+ 6. 3. 1966 (gesch.) Sümpfe v. Andouville (Manche) (49.25 N-1.14 W) Frankreich, ca. 780 km W.
6. 7 367 475 * 19. 8. 1965 Fängl. Trebur/Groß-Gerau (Rothmann)
+ 10. 1. 1966 (gesch.) Arbahoha, zw. Tanger u. Kénitra port (34.16 N-6.40 W), Marokko, ca. 1900 km SW.

Zwergschnepfe — *Limnocyptes minimus*

1. 7 362 760 * 6. 11. 1961 Fängl. b. Moischt/Marburg (Kliebe)
+ 27. 3. 1963 (getötet) Egletons (45.24 N-2.02 E) Correze, Frankreich, ca. 800 km SW.

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*

1. 80 240 767 * 22. 9. 1963 Fängl. Wohrasandfang b. Kirchhain/Marburg (Kliebe)
+ 15. 8. 1964 (getötet) Sainte Marie du Mont (49.22 N-1.14 W), Manche, Frankreich, ca. 770 km W.

Mauersegler — *Apus apus*

1. 7 192 840 ○ 1. 7. 1965 nestl. Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann)
× Mitt. v. 8. 8. 1965 (flugunfähig gefunden) Steyr (48.04 N-14.25 E) Österreich, ca. 420 km SE.

Blaukehlchen — *Luscinia svecica cyaneola*

1. 9 960 390 * 30. 3. 1963 Fängl. b. Moischt/Marburg (Kliebe)
× 22. 8. 1963 (tot gef.) im Kreis Kiwerzy, Geb. Luzk Luzhki, (51.47 N-34.10 E) Ukraine, UdSSR, ca. 1600 km E.

Fortsetzung von Band 37, S. 16, 1964

Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*

18. 0 214 383 * 17. 10. 1965 diesj. Ffm.-Oberrad (Steyer)
× 16. 1. 1966 (tot gef.) Andoins (43.21 N-0.15 W), Basses-Pyrenees, Frankreich, ca. 1100 km SW.
19. 0 121 593 * 10. 4. 1963 ad Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
× 13. 3. 1964 (tot gef.) Carbonne (43.18 N-1.12 E) Haute Garonne, Frankreich, ca. 850 km SW.
20. 054 955 * 5. 4. 1964 ad Bergen/Hanau (Lambert)
+ 19. 10. 1964 (getötet) Aubagne (43.17 N-5.35 E), Bouches-du-Rhône, Frankreich, ca. 750 km SW.
21. 0 250 196 * 22. 8. 1964 ad Enkheim/Hanau (Stecher)
? 30. 11. 1964 (Ring eingesandt) Jerez de la Frontera (36.41 N-6.08 W), Cadiz, Spanien, ca. 1900 km SW.
22. 0 232 605 * 3. 10. 1964 Fängl. Bickenbach/Darmstadt (Bartholmes)
× 5. 12. 1964 (tot gef.) Saint Maximin la Sainte Baume (43.27 N-5.51 E), Var, Frankreich, ca. 700 km SW.
23. 0 112 047 * 8. 10. 1965 diesj. Bergen-Hanau (Gerlach)
× Oktober 1965 (tot gef.) Torredonjimeno (37.45 N-3.58 W) Prov. Jaen, Spanien, ca. 1680 km SW.

Teichrohrsänger — *Acrocephalus scirpaceus*

1. 0 275 830 * 15. 8. 1965 Fägl. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
V 29. 8. 1965 (kontr.) Roxheim/Frankenthal, Rheinland-Pfalz
(Stalla), ca. 46 km SW.
2. 0 215 561 * 17. 8. 1964 Fägl. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
V 30. 5. 1965 (gef. u. frei) Carro 43.19 N-5.03 E)
ca. 40 km v. Marseille, B d Rh., Frankreich,
ca. 730 km SW.

Fortsetzung von Band 34, S. 11, 1961

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*

20. 9 850 190 * 20. 5. 1962 ad ♀ Gießen, Forstgarten (Vogeschutzwarte
Frankfurt/Main)
V 16. 5. 1963 (kontr.) Ffm.-Fechenheim (Lambert), ca. 48 km S.
21. 0 110 323 ○ 28. 5. 1963 nestl. bei Griesheim/Darmstadt (Fritzen)
V 29. 5. 1965 (kontr.) Ffm.-Stadtwald (Althen), ca. 25 km NE.
22. 9 655 875 ○ 4. 6. 1959 nestl. Oberursel/Ts. (Vogeschutzwarte
Frankfurt/Main)
V 10. 6. 1961 (kontr.) Hofheim a. Taunus (Schmidt)
V 19. 5. 1963 (kontr.) Hofheim a. Taunus (Schmidt),
ca. 15 km SW.
23. 0 157 987 ○ 6. 6. 1964 nestl. Elgershausen/Langenberg/Kassel (Giebler)
× 12. 7. 1964 (tot gef.) Ffm.-Riederwald (Spamer),
ca. 130 km SSW.
24. 047 739 ○ 11. 6. 1962 nestl. Steinheim/Offenbach (Vogeschutzwarte
Frankfurt/Main)
V 19. 5. 1963 (kontr.) Wolfgang/Hanau (Raab), ca. 10 km E.
25. 0 132 140 ○ 9. 6. 1963 nestl. Niedermittlau/Gelnhausen (Raab)
× 7. 5. 1964 (tot gef.) Offenbach/Main, ca. 25 km SWW.
26. 045 930 ○ 10. 6. 1962 nestl. Ffm.-Fechenheim (Lambert)
V 10. 5. 1963 (kontr.) Wolfgang/Hanau (Raab) ca. 18 km E.
27. 9 916 959 ○ 10. 6. 1963 fast flügge Groß-Umstadt/Dieburg (Rothmann)
× 27. 4. 1964 (tot gef.) Goldbach b. Aschaffenburg, Bayern,
ca. 22 km NE.
28. 0 216 669 ○ 31. 5. 1964 nestl. Zeppelinheim/Offenbach (Vogeschutzwarte
Frankfurt/Main)
× 17. 4. 1966 (v. Katze gef.) Altlußheim b. Mannheim
(Württemberg), ca. 65 km S.
29. 0 134 265 ○ 7. 6. 1963 nestl. bei Griesheim/Darmstadt (Fritzen)
× 2. 6. 1964 (tot gef.) Zipsendorf/Altenburg, Thüringen,
ca. 290 km NEE.
30. 9 689 009 ○ 5. 6. 1959 nestl. Hofheim a. Taunus (Schmidt)
() 26. 10. 1960 (gef. u. nicht mehr freigelassen)
Abiul (39.52 N-8.32 W) Portugal, ca. 1800 km SW.
31. 0 110 209 ○ 30. 5. 1963 nestl. Enkheim/Hanau (Lambert)
(?) 2. 9. 1965 (gefangen) Quintanilla (41.45 N-6.35 W)
Portugal, ca. 1040 km SW.
32. 0 216 221 ○ 16. 6. 1964 nestl. Eichelsdorf (Döpfer)
× 20. 9. 1964 (tot gef.) Vimioso (41.35 N-6.31 W), Portugal,
ca. 1050 km WS.

Heckenbraunelle — *Prunella modularis*

9. 80 256 016 * 3. 3. 1964 Fägl. Oberursel/Obertaunuskreis (Mohr)
(?) 4. 12. 1964 (Fundumstände unbek.) Verdun-sur-Garonne
(43.51 N-1.14 E), Frankreich, ca. 900 km SW.
10. 0 199 954 * 25. 4. 1964 ad bei Kirchhain/Marburg (Kliebe)
× März 1965 (tot gef.) Urrugne (43.23 N-1.39 W),
Basses-Pyrenees, Frankreich, ca. 1140 km SW.

Wiesenpieper — *Anthus pratensis*

1. 0 199 892 * 17. 10. 1963 Fägl. Moischt/Marburg (Kliebe)
× zw. 10. u. 15. 12. 1963 (tot gef.) Benalup, Medina Sidonia
(36.28 N-5.55 W), Prov. Cadiz, Spanien,
ca. 1960 km SW.
2. 80 240 809 * 4. 10. 1963 Fägl. Moischt/Marburg (Kliebe)
+ 18. 11. 1964 (geschossen) Ferreira do Alentejo (38.04 N-8.06 W),
Portugal, ca. 1950 km SW.

Fortsetzung von Band 37, S. 17, 1964

Bachstelze — *Motacilla alba*

7. 80 131 206 * 2. 9. 1962 ad Dieburg (49.53 N-8.51 E) (Rothmann)
+ Januar 1965 (erbeutet) b. Carmona/Sevilla (37.28 N-5.38 W),
Spanien, ca. 1750 km SW.
8. 80 166 517 * 29. 6. 1963 diesj. Nieder-Roden/Dieburg (Rothmann)
+ 30. 11. 1964 (erbeutet) Fuente Piedra (37.08 N-4.44 W),
Malaga, Spanien, ca. 1740 km SW.
9. 0 243 680 * 19. 9. 1964 Fägl. Frankfurt/Main-Höchst (Steyer)
(?) 3. 1. 1965 (wieder gef.) Casablanca (33.39 N-7.35 W) Marokko,
ca. 2300 km SW.

Fortsetzung von Band 38, S. 93, 1965

Schafstelze — *Motacilla flava*

12. 0 276 006 * 20. 8. 1965 ad ♂ Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
V 3. 9. 1965 (kontr.) Weiterstadt/Darmstadt (Fritzen)
ca. 20 km NWW.
13. 0 275 709 * 14. 8. 1965 diesj. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
V 10. 9. 1965 (kontr.) Weiterstadt/Darmstadt (Fritzen)
ca. 20 km NWW.
14. 0 160 918 * 22. 8. 1964 diesj. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
V 10. 9. 1965 (kontr.) Weiterstadt/Darmstadt (Bartholmes),
ca. 20 km NWW.
15. 0 275 529 * 9. 8. 1965 diesj. Lengfeld/Dieburg (Rothmann)
V 11. 9. 1965 (kontr.) Roxheimer Altrhein/Rheinland-Pfalz
(Matthes), ca. 50 km SW.
16. 0 244 141 * 31. 8. 1964 diesj. Lengfeld/Dieburg (Rothmann)
V 14. 4. 1965 (kontr.) b. Le Barcares (42.47 N-3.02 E)
Pyrenees, Frankreich, zusätzlich mit Paris 576 267
beringt, ca. 900 km SW.
17. 0 162 585 * 13. 9. 1963 ad ♂ Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
(?) 2. 11. 1965 (mit Falle gef.) Teba (36.59 N-4.55 W) Malaga,
Spanien, ca. 1730 km SW.
18. 0 199 957 * 13. 5. 1964 ad Kirchhain/Marburg (Kliebe)
(?) 7. 11. 1964 (unbek.) East Marismas v. Guadalquivier,
bei Las Cabezas, (36.59 N-5.56 W) Sevilla, Spanien,
ca. 1950 km SW.

19. 0 186 616 * 19. 8. 1963 diesj. bei Moischt/Marburg (Kliebe)
(?) 20. 11. 1963 (gefangen) Alameda (37.12 N-4.39 W) Malaga,
Spanien, ca. 1760 km SW.

Fortsetzung von Band 38, S. 94, 1965

Stieglitz — *Carduelis carduelis*

15. 80 056 609 * 11. 9. 1960 diesj. Fehlheim/Bergstraße (Scheurich)
× 16. 6. 1965 (tot gef.) zw. Pfungstadt und Hahn/Darmstadt,
ca. 10 km N.
16. 80 257 580 * 12. 5. 1964 ad ♂ Bickenbach/Darmstadt (Bartholmes)
× 7. 1. 1965 (tot gef.) Villeneuve (43.54 N-0.18 W) Landes,
Frankreich, ca. 850 km SW.
17. 0 162 824 * 21. 9. 1963 diesj. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
() 12. 2. 1965 (gef. u. lebend gehalten) Miranda de Ebro
(42.41 N-2.57 W) Burgos, Spanien, ca. 1220 km SW.
18. 097 240 * 9. 9. 1962 ad Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
(?) 3. 5. 1965 (gefunden) bei Teruel (40.21 N-1.06 W) Spanien,
ca. 1250 km SW.
19. 0 276 294 * 26. 9. 1965 diesj. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
(?) 1. 11. 1965 (gefangen, Ring gesandt) Villamayor
(41.42 N-0.43 W) Zaragoza, Spanien, ca. 1120 km SW.
20. 0 275 853 * 17. 8. 1965 diesj. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
(?) 24. 10. 1965 (gefangen, Ring gesandt) bei Zaragoza
(41.39 N-0.52 W) Spanien, ca. 1150 km SW.

Fortsetzung von Band 38, S. 94/95, 1964

Zeisig — *Carduelis spinus*

66. 80 256 919 * 9. 2. 1965 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunuskreis (Mohr)
V 28. 3. 1965 (kontr.) Offenbach/Waldheim (Richter)
ca. 20 km SE.
67. 0 311 263 * 7. 10. 1965 ad ♂ Ffm.-Fechenheim (Spamer)
V 29. 3. 1966 (kontr.) Ravensburg/Württemberg, ca. 260 km SEE.
68. 0 207 384 * 1. 9. 1964 ad ♂ Bad Vilbel/Friedberg (Armbrust)
V 17. 3. 1965 (kontr.) Neuhausen (47.42 N-8.37 E) Schaffhausen,
Schweiz, ca. 280 km S.
umberingt auf Sempach-Ring E 165 840
69. 0 161 678 * 31. 10. 1964 diesj. ♂ Bickenbach (Bartholmes)
V 3. 1. 1965 (kontr.) Odelem/West-VI. (51.10 N-3.20 E)
Belgien, ca. 400 km NW.
70. 053 620 * 11. 1. 1963 ad, nicht vorj. ♀ Oberursel/Obertaunuskreis
(Mohr)
V 26. 1. 1965 (kontr.) Schoten (51.15 N-4.30 E) Antwerpen,
Belgien, ca. 340 km NE.
umberingt auf Bruxelles 6 A 51 549
71. 80 256 526 * 24. 10. 1964 diesj. ♂ Oberursel/Obertaunuskreis (Mohr)
+ 18. 11. 1964 (getötet) Arsiero (45.48 N-11.22 E) Vicenza, Veneto,
Italien, ca. 525 km SE.
72. 80 063 229 * 20. 11. 1960 diesj. ♀ Oberursel/Obertaunuskreis (Mohr)
+ Oktober 1964 (getötet) Enego (45.57 N-11.41 E) Vicenza, Italien,
ca. 530 km SE.

Fortsetzung von Band 37, S. 18, 1963

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*

3. 7 303 376 * 7. 3. 1964 ad ♂ Bad Salzhausen/Büdingen (Döpfer)
(?) 24. 1. 1965 (gefangen) Gajwa (58.00 N-56.12 E) bei Perm,
UdSSR, ca. 3000 km NEE.

Fortsetzung von Band 38, S. 96, 1964

Bergfink — *Fringilla montifringilla*

28. 80 237 671 * 2. 3. 1964 ad Gießen (Bracke)
× 5. 3. 1964 (tot gef.) Butzbach/Friedberg (Vogt) ca. 17 km S.
29. 80 281 734 * 20. 12. 1965 ad ♀ Büdesheim/Büdingen (Lokai)
V 19. 1. 1966 (kontr.) Ffm.-Stadtwald Abt. 4 b (Steyer),
ca. 18 km SW.
30. 0 111 595 * 31. 12. 1964 Fängl. Zeppelinheim/Offenbach (Böhm)
V 13. 2. 1965 (kontr.) Solingen-Kohlfurt, Nordrhein-Westfalen
(Müller) ca. 160 km NW.
31. 80 200 927 * 21. 2. 1964 ad Ffm.-Stadtwald Abt. 4 b (Steyer)
× 28. 2. 1965 (tot gef.) St. Bazeilla Marmande (44.32 N-0.06 E),
Frankreich, ca. 850 km SW.
32. 80 292 040 * 3. 3. 1965 vorj. ♂ Oberursel/Obertaunuskreis (Mohr)
+ November 1965 (getötet) Pietrasanta (43.57 N-10.14 E), Lucca,
Italien, ca. 710 km SSE.
33. 80 174 416 * 30. 12. 1962 Fängl. ♀ Bensheim/Bergstraße (Bartholmes)
+ Februar-Mai 1965 (geschossen) bei Macharadse
(41.57 N-42.00 E), Georgische SSR, UdSSR,
ca. 2750 km SSE.

Grauwammer — *Emberiza calandra*

1. 7 367 163 * 15. 9. 1962 Fängl. Reinheimer Teich/Dieburg (Rothmann)
+ 15. 10. 1964 (getötet) Saint-Jean en Royans (44.55 N-5.12 E)
Drome, Frankreich, ca. 600 km SW.

Ringfunde auswärtiger Stationen in Hessen

Krickente — *Anas crecca*

- Mus. Paris
EX 4 667 * 17. 12. 1964 ad ♂ Station Biologique de la Tour du Valat
(43.30 N-4.40 E) Frankreich
× 4. 9. 1965 (tot gef.) Kühkopf b. Stockstadt (49.49 N-8.28 E)
(Dr. Keil-H. Schulze), ca. 800 km NNE.

Lachmöwe — *Larus ridibundus*

- Mus. Prag
E 157 803 ○ 3. 7. 1965 n. fl. Teich „Blatec“ (49.07 N-14.18 E) b. Divčice,
Tschechoslowakei
× 23. 2. 1966 (tot gef.) Frankfurt/Main (50.06 N-8.41 E)
(Buhl), ca. 410 km NWW.

Eichelhäher — *Garrulus glandarius*

- Polen
F 545 682 * 6. 10. 1965 Fängl. Mierzeja Wiślana (54.19 N-19.14 E)
Bez. Gdańsk, Polen
+ 30. 1. 1966 (gesch.) N v. Pfordt (50.39 N-9.36 E) (Reinhardt)
ca. 740 km SW.

- Polen
F 545 419
- * 4. 10. 1965 Fängl. Mierzeja Wiślana (54.19 N-19.14 E)
Bez. Gdańsk, Polen
+ 14. 11. 1965 (gesch.) bei Schwarz (50.43 N-9.26 E)
(Knobloch) ca. 750 km SW.
- Kohlmeise — *Parus major*
- Radolfzell
H 526 443
- 17. 5. 1959 nestl. Klepsau Kr. Buchen, Baden (Hassel)
V Sommer 1959 (kontr.) Ring entfernt, Butzbach/Hessen,
(Vogt) ca. 120 km NW.
- Blaukehlchen — *Luscinia svecia cyaneola*
- Polen
H 98 991
- * 3. 9. 1963 Fängl. ♀ Nowa Pseka (54.26 N-19.45 E) Polen
V 15. 9. 1963 (kontr.) Reinheimer Teich (49.49 N-8.50 E)
(Rothmann) ca. 800 km SW,
umberingt auf Helgoland 0 162 659.
- Heckenbraunelle — *Prunella modularis*
- Radolfzell
K 467 488
- * 3. 4. 1965 ad Weiersbach Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
(Weitz)
× n. Mitt. v. 1. 7. 1965 dieser Tage (tot gef.) Sinn/Dillkreis
(Schäfer) ca. 130 km NE.
- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
- Museum Prag
RR 80 798
- * 18. 5. 1964 ad ♀ Dablice b. Prag (50.08 N-14.28 E)
Tschechoslowakei (Dr. L. Halik)
V 8. 3. 1965 (kontr.) Frankfurt/Main-Oberrad (50.06 N-8.41 E)
(Steyer) ca. 400 km W.
- Zeisig — *Carduelis spinus*
- Radolfzell
H 904 338
- * 10. 2. 1964 Fängl. ♂ Lachen/Neustadt (49.19 N-8.12 E)
Rheinland-Pfalz (Herrmann)
× 23. 2. 1966 (tot gef.) Offenbach/Main (50.06 N-8.46 E)
(Tkalec) ca. 90 km NE.
- Moskau
S 221 912
- * 29. 9. 1965 Fängl. ♂ Neringa b. Juodkrante
(55.33 N-21.07 E) Litauische SSR
10. 2. 1966 Frankfurt/Main (50.06 N-8.41 E)
20. 3. 1966 ca. 1000 km SW.
- Gimpel — *Pyrhula pyrrhula*
- Mus. Paris
SA 024 740
- * 19. 1. 1964 ad ♂ Sessenheim, Bas Rhin (48.48 N-7.59 E)
Lefranc, Frankreich, ca. 200 km NNE
V 22. 12. 1964 (kontr.) Alten-Busseck (50.38 N-8.45 E).
- Mus. Paris
SJ 0 491
- * 2. 11. 1964 Fängl. ♀ Fouday, Bas Rhin (48.26 N-7.12 E)
(Herzog) Frankreich, ca. 210 km NNE
× 12. 4. 1965 (tot gef.) Schloßborn (50.12 N-8.24 E).
- Radolfzell
G 259 193
- * 23. 2. 1964 Fängl. ♂ Harthausen/Speyer (Hoffmann)
Rheinland-Pfalz
V 30. 4. 1965 (kontr.) Willingshausen/Treysa (Stumpf)
ca. 180 km NNE.
- Radolfzell
G 199 971
- * 15. 9. 1965 Fängl. Staffelstein/Oberfr. (50.06 N-11.00 E)
(Schnabel) Bayern
× 12. 4. 1966 (g. Fenster gefl., tot) Darmstadt-Eberstadt
(49.49 N-8.38 E) (Arnhold) ca. 165 km SWW.

- Buchfink — *Fringilla coelebs*
- Moskau
S 046 164
- * 11. 4. 1963 ad ♂ Rybatschi/Kaliningrad (fr. Rossitten)
(55.11 N-20.49 E)
× 2. 10. 1964 (tot gef.) Gottstreu/Hofgeismar
(51.34 N-9.36 E) ca. 850 km SW.
- Mus. Brüssel
2 V 99 389
- * 11. 10. 1963 Fängl. ♀ Foret-Trooz (50.34 N-5.41 E) Liege,
(Goffart) Belgien
× 24. 12. 1964 (tot gef.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 205 km ESE.
- Bergfink — *Fringilla montifringilla*
- Mus. Brüssel
3 V 45 503
- * 18. 10. 1964 diesj. ♂ Vottem (50.41 N-5.35 E) Liege (Melot)
Belgien
V 25. 2. 1965 (kontr.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 220 km ESE.
V 26. 2. 1965 (kontr.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 220 km ESE.
- Graumammer — *Emberiza calandra*
- Mus. Paris
SA 052 151
- * 29. 11. 1963 Fängl. ♂ Station Biolog. de la Tour Valat
(43.30 N-4.40 E) Frankreich
V 9. 9. 1964 (kontr.) Reinheimer Teich (49.49 N-8.50 E)
(Rothmann) ca. 750 km NNE,
umberingt auf Helgoland 7 367 632.

Anschrift des Berichterstatters: GERHARD LAMBERT, 6 Ffm.-Fechenheim, Elmer Weg 9.

KLEINE MITTEILUNGEN

Seidenreiher — *Egretta garzetta* — im Kreis Bingen

Am Abend des 7. Mai 1966 flog im Rheinufergelände östlich von Bingen-Gaulsheim ein Seidenreiher in Höhe der Weidenkronen nach Westen. Es ist das erste Stück dieser Art, das seit 76 Jahren in Hessen und seinen Randzonen beobachtet wurde (GEBHARDT & SUNKEL 1954). Der letzte Nachweis gelang 1890 bei Wiesbaden-Schierstein (ca. 20 km entfernt).

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es sich um ein Tier aus der französischen Kolonie von La Dombes bei Lyon handelt. Seit der Besiedlung dieses Gebiets durch Seidenreiher in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts — 1947 sogar eine kleine Kolonie in der Loiremündung — sind allein in der Schweiz etwa 50 Exemplare beobachtet worden (VALVERDE, 1955), alle zwischen April und Juli mit einem auffallenden Maximum gegen Ende Mai. (GLUTZ VON BLOTZHEIM [1962] hält eine Ansiedlung in der Schweiz nicht für ausgeschlossen.) Auf diesen deutlichen Trend der Frühjahrsbewegung nach Norden, der sich auch in Holland bemerkbar macht (19 Meldungen nach 1900, davon 11 nach 1950 [1962]), hat VALVERDE (1955) nachdrücklich hingewiesen, er und GEROUDET halten solche Individuen für Vögel, die ihre Gelege verloren haben. (Erste Gelege in La Dombes ab 10. April.) Es ist daher nicht ganz verständlich, daß der Seidenreiher bei uns zu den ausgefallensten Seltenheiten zählt.

Literatur:

- GEBHARDT, L., & W. SUNKEL (1954): Die Vögel Hessens. Frankfurt a. M.
VALVERDE, J. A. (1955): Essai sur l'aigrette garzette (*Egretta garzetta*) en France. — *Alauda*, 23,4, p. 278.
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1962): Die Brutvögel der Schweiz. Aargau.
COMMISSIE VOOR DE NEDERLANDSE AVIFAUNA (1962): Avifauna van Nederland. Leiden.
ULF HESELER, 622 Rüdesheim/Rhein, Kieseler Weg 11