

- Polen
F 545 419
- * 4. 10. 1965 Fängl. Mierzeja Wiślana (54.19 N-19.14 E)
Bez. Gdańsk, Polen
+ 14. 11. 1965 (gesch.) bei Schwarz (50.43 N-9.26 E)
(Knobloch) ca. 750 km SW.
- Kohlmeise — *Parus major*
- Radolfzell
H 526 443
- 17. 5. 1959 nestl. Klepsau Kr. Buchen, Baden (Hassel)
V Sommer 1959 (kontr.) Ring entfernt, Butzbach/Hessen,
(Vogt) ca. 120 km NW.
- Blaukehlchen — *Luscinia svecia cyaneecula*
- Polen
H 98 991
- * 3. 9. 1963 Fängl. ♀ Nowa Paseka (54.26 N-19.45 E) Polen
V 15. 9. 1963 (kontr.) Reinheimer Teich (49.49 N-8.50 E)
(Rothmann) ca. 800 km SW,
umberingt auf Helgoland 0 162 659.
- Heckenbraunelle — *Prunella modularis*
- Radolfzell
K 467 488
- * 3. 4. 1965 ad Weiersbach Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
(Weitz)
× n. Mitt. v. 1. 7. 1965 dieser Tage (tot gef.) Sinn/Dillkreis
(Schäfer) ca. 130 km NE.
- Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*
- Museum Prag
RR 80 798
- * 18. 5. 1964 ad ♀ Dablice b. Prag (50.08 N-14.28 E)
Tschechoslowakei (Dr. L. Halik)
V 8. 3. 1965 (kontr.) Frankfurt/Main-Oberrad (50.06 N-8.41 E)
(Steyer) ca. 400 km W.
- Zeisig — *Carduelis spinus*
- Radolfzell
H 904 338
- * 10. 2. 1964 Fängl. ♂ Lachen/Neustadt (49.19 N-8.12 E)
Rheinland-Pfalz (Herrmann)
× 23. 2. 1966 (tot gef.) Offenbach/Main (50.06 N-8.46 E)
(Tkalec) ca. 90 km NE.
- Moskau
S 221 912
- * 29. 9. 1965 Fängl. ♂ Neringa b. Juodkrante
(55.33 N-21.07 E) Litauische SSR
10. 2. 1966 Frankfurt/Main (50.06 N-8.41 E)
20. 3. 1966 ca. 1000 km SW.
- Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula*
- Mus. Paris
SA 024 740
- * 19. 1. 1964 ad ♂ Sessenheim, Bas Rhin (48.48 N-7.59 E)
Lefranc, Frankreich, ca. 200 km NNE
V 22. 12. 1964 (kontr.) Alten-Busseck (50.38 N-8.45 E).
- Mus. Paris
SJ 0 491
- * 2. 11. 1964 Fängl. ♀ Fouday, Bas Rhin (48.26 N-7.12 E)
(Herzog) Frankreich, ca. 210 km NNE
× 12. 4. 1965 (tot gef.) Schloßborn (50.12 N-8.24 E).
- Radolfzell
G 259 193
- * 23. 2. 1964 Fängl. ♂ Harthausen/Speyer (Hoffmann)
Rheinland-Pfalz
V 30. 4. 1965 (kontr.) Willingshausen/Treysa (Stumpf)
ca. 180 km NNE.
- Radolfzell
G 199 971
- * 15. 9. 1965 Fängl. Staffelstein/Oberfr. (50.06 N-11.00 E)
(Schnabel) Bayern
× 12. 4. 1966 (g. Fenster gefl., tot) Darmstadt-Eberstadt
(49.49 N-8.38 E) (Arnhold) ca. 165 km SWW.

- Moskau
S 046 164
- Buchfink — *Fringilla coelebs*
- * 11. 4. 1963 ad ♂ Rybatschi/Kaliningrad (fr. Rossitten)
(55.11 N-20.49 E)
× 2. 10. 1964 (tot gef.) Gottstreu/Hofgeismar
(51.34 N-9.36 E) ca. 850 km SW.
- Mus. Brüssel
2 V 99 389
- * 11. 10. 1963 Fängl. ♀ Foret-Trooz (50.34 N-5.41 E) Liege,
(Goffart) Belgien
× 24. 12. 1964 (tot gef.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 205 km ESE.
- Bergfink — *Fringilla montifringilla*
- Mus. Brüssel
3 V 45 503
- * 18. 10. 1964 diesj. ♂ Vottem (50.41 N-5.35 E) Liege (Melot)
Belgien
V 25. 2. 1965 (kontr.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 220 km ESE.
V 26. 2. 1965 (kontr.) Oberursel/Ts. (Mohr) ca. 220 km ESE.
- Grauwammer — *Emberiza calandra*
- Mus. Paris
SA 052 151
- * 29. 11. 1963 Fängl. ♂ Station Biolog. de la Tour Valat
(43.30 N-4.40 E) Frankreich
V 9. 9. 1964 (kontr.) Reinheimer Teich (49.49 N-8.50 E)
(Rothmann) ca. 750 km NNE,
umberingt auf Helgoland 7 367 632.

Anschrift des Berichterstatters: GERHARD LAMBERT, 6 Ffm.-Fechenheim, Elmer Weg 9.

KLEINE MITTEILUNGEN

Seidenreihler — *Egretta garzetta* — im Kreis Bingen

Am Abend des 7. Mai 1966 flog im Rheinufergelände östlich von Bingen-Gaulsheim ein Seidenreihler in Höhe der Weidenkronen nach Westen. Es ist das erste Stück dieser Art, das seit 76 Jahren in Hessen und seinen Randzonen beobachtet wurde (GEBHARDT & SUNKEL 1954). Der letzte Nachweis gelang 1890 bei Wiesbaden-Schierstein (ca. 20 km entfernt).

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es sich um ein Tier aus der französischen Kolonie von La Dombes bei Lyon handelt. Seit der Besiedlung dieses Gebiets durch Seidenreihler in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts — 1947 sogar eine kleine Kolonie in der Loiremündung — sind allein in der Schweiz etwa 50 Exemplare beobachtet worden (VALVERDE, 1955), alle zwischen April und Juli mit einem auffallenden Maximum gegen Ende Mai. (GLUTZ VON BLOTZHEIM [1962] hält eine Ansiedlung in der Schweiz nicht für ausgeschlossen.) Auf diesen deutlichen Trend der Frühjahrsbewegung nach Norden, der sich auch in Holland bemerkbar macht (19 Meldungen nach 1900, davon 11 nach 1950 [1962]), hat VALVERDE (1955) nachdrücklich hingewiesen, er und GEROUDET halten solche Individuen für Vögel, die ihre Gelege verloren haben. (Erste Gelege in La Dombes ab 10. April.) Es ist daher nicht ganz verständlich, daß der Seidenreihler bei uns zu den ausgefallensten Seltenheiten zählt.

Literatur:

- GEBHARDT, L., & W. SUNKEL (1954): Die Vögel Hessens. Frankfurt a. M.
VALVERDE, J. A. (1955): Essai sur l'aigrette garzette (*Egretta garzetta*) en France. — *Alauda*, 23,4, p. 278.
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1962): Die Brutvögel der Schweiz. Aargau.
COMMISSIE VOOR DE NEDERLANDSE AVIFAUNA (1962): Avifauna van Nederland. Leiden.
ULF HESELER, 622 Rüdesheim/Rhein, Kieseler Weg 11